

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(mFOLFOX6+P-mab CVポート用 大腸) (クール目)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)
体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000


() の理由にて、() %量で投与します。

※1ヶ月に1回Mg測定を行う

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日
①	生食 100mL		ルートキープ		
②	○ プロイメンド 150mg	生食 100mL	30分	点滴(側管)	
	● プロイメンドなし				
③	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン3.3mg 2A		10分	点滴(側管)	
④	ヘクティベックス 6mg/kg 減量基準等は別紙参照 () mg/body	生食 100mL 10mg/mLを超えない	60分	点滴(メイン)	
	ルートキープをフラッシュ				
⑤	エルプラット※ 85mg/m ² () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(メイン)	
⑥	レボホリナート 200mg/m ² () mg/body	5%糖液 250mL	2時間	点滴(側管)	
⑦	5-FU 400mg/m ² () mg/body	5%糖液 100mL	全開で投与	点滴(メイン)	
⑧	5-FU 2400mg/m ² () mg/body	5%糖液 適量:合計115mL ※2.5mL/Hインフューザーポンプ	46時間	持続注	

※エルプラットは、Grade1程度のアレルギー時は投与前(制吐剤前)にボラミン注投与
+デカドロン5Aへ変更+エルプラット開始30分程度は減速投与で対応も可

投与方法



投与スケジュール

